

Dritte Serie.

Tafel XIV.

Verschiedene dem Raps schädliche Insekten.




## Figurenerklärung.

- Fig. 1. Blüten und junge Schoten des Rapses, vom Raps-Glanz-  
käfer *Meligethes aëneus Fabricius* (K) und seiner  
Larve (L L L L) angefressen. — Natürl. Grösse.
- „ 2. 3. Larve und entwickeltes Insekt des Raps-Glanzkäfers.  
— 5fach vergr.
- „ 4. Junge Rapsschoten, angefressen und versponnen durch  
die Raupe (R) des Raps-Zünslers *Orobena extimalis*  
*Scriba.* — Natürl. Grösse.
- „ 5. Der Raps-Zünsler *Orobena extimalis Scr.* — Natürl.  
Grösse.
- „ 6. Rübsen-Blatt mit einer Mine (M), welche von der Larve  
der Fliege *Drosophila flaveola Meigen* ausgefressen  
ist. — Natürl. Grösse.
- „ 7. 8. Made und entwickeltes Insekt von *Drosophila fla-*  
*veola Mg.* — 5fach vergr.

---

## Bemerkungen.

Der Raps-Glanzkäfer, *Meligethes aëneus Fabricius*, ist  
einer der schlimmsten Feinde des Rapsbaues, indem der Käfer  
die Blütenorgane zerfrisst und seine Larve die jungen Schoten  
benagt. Zur Bekämpfung des Schädlinges ist das wirksamste



Verlag von Eugen Ulmer, Stuttgart.

H. Boltshauser ad nat. del.

Verschiedene dem Raps schädliche Insekten.

Mittel das frühzeitige Wegfangen und Vernichten der Käfer, wozu man neuerdings einen eigenen Fangkarren (von Sommer in Langenbielau) konstruiert hat. — Vgl. Kirchner, Pflanzenkr. S. 174, 175, 566.

Die Beschädigungen, welche die Raupen des Raps-Zünslers *Orobena extimalis Scriba* an den jungen Schoten anrichten, waren bisher vereinzelt und deshalb so wenig belangreich, dass Abwehrmassregeln gegen den Schmetterling noch nicht erforderlich wurden. — Näheres s. Kirchner, Pflanzenkr. S. 175 u. 504.

Auch die von den Maden von *Drosophila flaveola Meigen* in die Blätter des Rapses und Rübens gefressenen Minen führen keine empfindliche Beschädigung der Pflanzen herbei. Näheres s. Kirchner, Pflanzenkr. S. 172 u. 489.

